

# | BLACK YOSEMITE

# | INTRODUCCIÓN

Yosemite es una variedad primocaña con espinas de alta producción y extra precoz, la cual destaca por su vida de anaquel. Presenta frutos con excelente firmeza y muy baja regresión, además de ser de fácil manejo agronómico y porte vegetativo vigoroso. Mantiene una producción continua gracias a su constante renovación y diferenciación, sobresaliendo su gran adaptabilidad a las diferentes zonas de producción en México.

# | CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD



Inicia su cosecha a partir de los **4.5 meses** en primer año, después de plantación.



Brix:  
**10.6°**



Vida de anaquel:  
**14 días**



Peso promedio de la fruta:  
**8 g**

# | MANEJO CULTURAL



**Producción en otoño:**  
de septiembre a diciembre.

**Producción de invierno-primavera:**  
de enero a mayo.



Preferentemente tener macro túnel con plástico lechoso durante la producción.



Se recomienda tutoreo tipo "H" (cinco alambres centrales y laterales).



Durante el cultivo se aconseja deshojar la base de las cañas, mantener buena ventilación y evitar estrés hídrico.



# | MANEJO PRODUCTIVO

- La plantación se recomienda en abril y mayo para producción de otoño en adelante.
- La plantación se recomienda en junio y julio para producción de invierno en adelante.
- La densidad de plantación sugerida es de 5,050 plantas por hectárea.
- Es importante manejar la planta en producción continua, con podas selectivas conforme las cañas terminan su ciclo.

## SEGUNDO AÑO

- Para la producción de otoño, realizar poda a nivel del suelo entre mayo y junio. Posteriormente, se recomienda raleo de hijuelos, dejando de 10 a 12 cañas por metro lineal.
- Este año, la planta comienza a cosecharse aproximadamente 4 meses después de la poda a nivel del suelo. Debe manejarse con poda a media caña o continuar con podas selectivas más detalladas.

# | FENOLOGÍA REPRODUCTIVA

## I INICIO FLORAL

Avanza hacia las puntas de las cañas principales y se renueva mediante nuevos cargadores laterales.

## I FLORACIÓN CONTINUA

Dejar de 6-8 cañas.

Nota: Se deberá dejar dos brotes nuevos (siempre los de mayor grosor).


## I COSECHA

Puede realizarse tres veces por semana en meses cálidos y dos veces por semana en meses fríos.




Estos manejos dependerán de las fechas de plantación y la ecorregión donde se encuentre el cultivo

# DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO



Gráfica 1. Curvas de producción de la variedad Yosemite en primer año productivo, temporada 2024 -25.





"Los datos y resultados contenidos en este documento tienen carácter meramente informativo y NO CONTRACTUAL. Estos datos se han obtenido en condiciones específicas y controladas. Las plantas pertenecen al dominio de lo vivo y se ven afectadas, en su proceso productivo, por una pluralidad de factores como las condiciones climáticas y geográficas, el manejo del campo o las características del suelo. Por ello, Planasa NO GARANTIZA la obtención de los resultados de su operación, aunque se hayan seguido las indicaciones aquí contenidas. Le recomendamos que concierte una cita con un asesor técnico de Planasa para visitar una explotación cercana y evaluar la plantación de la variedad".

[PLANASA.COM](http://PLANASA.COM)

